

Рак мочевого пузыря: факты


В лечении метастатического рака мочевого пузыря не произошло значительных прорывов за последние 30 лет¹

Хронология терапии




Цифры²

Рак мочевого пузыря входит в первую десятку списка наиболее распространенных видов рака в мире



Распространенные симптомы⁴



Прогноз

Примерно в 1-ом случае из 10-ти, к тому времени, как рак мочевого пузыря был диагностирован, он уже имеет распространенную форму⁵



Прогноз в случае рака мочевого пузыря в поздней стадии **неблагоприятный**



ТОЛЬКО
5,4%
пациентов

живы через
5
лет после постановки диагноза

Эти статистические данные говорят о необходимости новых методов терапии

Список литературы:

1. Powles T et al. MPDL3280A (anti-PD-L1) treatment leads to clinical activity in metastatic bladder cancer. Nature 2014; 515(7528): 558–62
2. Ferlay J et al. GLOBOCAN 2012 v1.0. Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: <http://globocan.iarc.fr>. Accessed August 2015
3. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность). 2016.
4. National Cancer Institute: PDQ® Bladder Cancer Treatment. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Date last modified July 2015. Available at: <http://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq>. Accessed August 2015
5. National Cancer Institute: SEER Stat Fact Sheets: Bladder Cancer. Available at: <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html>. Accessed September 2015